


ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ РАСЩЕПЛЕННАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

Ультрикс® | Квадри | **ФОРТ** 

РУ № ЛП-005594 ОТ 19 ИЮНЯ 2019 Г.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ВСЕМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ ПО СОСТАВУ И КОЛИЧЕСТВУ ГЕМАГГЛЮТИНИНА КАЖДОГО ШТАММА ВИРУСА ГРИППА



**15 мкг
А/Н1Н1**



**15 мкг
А/Н3Н2**



**15 мкг
В**



15 мкг
дополнительный актуальный
штамм вируса В

ЛИНИЯ YAMAGATA

ЛИНИЯ VICTORIA

- действующие вещества – антигены вирусов гриппа – получают из очищенных вирусов гриппа типа А и В, выращенных отдельно в развивающихся куриных эмбрионах
- всего в одной дозе вакцины содержится 60 мкг антигенов
- без консервантов, стабилизаторов и адъювантов
- соответствует критериям иммуногенности для инактивированных гриппозных вакцин, принятых в Евросоюзе и Российской Федерации
- российское производство полного цикла в соответствии со стандартами GMP

 **Нацимбио**

ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Показания к применению вакцины Ультрикс® Квадри:
активная ежегодная профилактическая иммунизация против
сезонного гриппа детей с 6 месяцев, беременных, подростков
и взрослых без ограничения возраста

«Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата
Ультрикс® Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная
расщепленная, раствор для внутримышечного введения»
((Изменение № 5 от 12.08.2021 к Инструкции по применению
ЛП-005534-190610 от 19.06.2019 Минздрава России)

Вакцина особенно показана:

1. Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;
- лицам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом иммунодефицита человека;
- беременным женщинам, начиная со II-го триместра;
- лицам старше 60 лет.

2. Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им от других лиц:

- учащимся образовательных учреждений, студентам;
- работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащим и т.д.

Исследовательские центры, где проводились клинические исследования:

- ФГБУЗ «МСЧ № 163 ФМБА», Новосибирская обл., Новосибирский район, раб. пос. Кольцово
- «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь
- ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», г. Самара

127473, г. Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10
fort-bt.ru

390540, Рязанская область, Рязанский район, Окское с/п, 1А
тел.: +7 4912 701 500
факс: +7 4912 701 501